

سولان

شراب للأطفال
لعلاج أعراض السعال ونزلة البرد

التكوين

يحتوي كل ٥ مل (ملعقة صغيرة) على:

المواد الفعالة: مالميات الكلوروفيرامين ١ ملغم

هيدروكلوريد الفينيل إرين ٢.٥ ملغم

جوايفنزين (جليسيريل جواياكولات) ٥٠ ملغم

المواد غير الفعالة: حمض الأسكوربيك، سكروز، سكارين الصوديوم، بنزوات الصوديوم، كوينولين أسطر، إيثبات ثنائي الصوديوم، إيثانول ٩٦٪، جليسيرين، نكهة الفراولة، ماء، سلف.

الخواص

يعد سولان تركيبة فعالة للأطفال للسعال ونزلة البرد، وهي تحتوي على مزيج لاحتقان، ومضاد للهستامين، وطارد للبلغم، وذلك لضمان علاج سريع وفعال لأعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

يعمل سولان عن طريق تخفيف الغشاء المخاطي للأنف، والتقليل من تورم الأغشية المخاطية، إضافة إلى إزاحة الإفرازات اللزجة من الممرات التنفسية.

دواعي الاستعمال

يعد سولان فعال في علاج الأطفال الذين يعانون من أعراض السعال المصحوب بإفرازات، واحتقان الأنف، وسيلان الأنف، والعطس، والمصاحبة للحساسية أو لنزلة البرد.

الجرعة

الأطفال ١ - ٢ سنوات من العمر: ٥ مل (١ ملعقة صغيرة) مرتين يومياً.

الأطفال ٢ - ٦ سنوات من العمر: ٥ مل (١ ملعقة صغيرة) كل ٦ ساعات يومياً.

الأطفال ٦ - ١٢ سنة من العمر: ١٠ مل (٢ ملعقة صغيرة) كل ٦ ساعات يومياً.

إذا سهوت عن تناول جرعة

في حال التباك جدولاً منظماً للجرعات وسهوت عن تناول جرعة:

- يجب أخذ الجرعة في أسرع وقت ممكن.

- إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فيستحسن الاستمرار في جدول الجرعات دون أخذ تلك الجرعة.

- يجب عدم أخذ جرعتين في آن واحد.

نواهي الاستعمال

يجب عدم استعمال هذا الدواء من قبل المرضى الذين يعانون من الحساسية لأحد مكوناته، إضافة إلى هؤلاء الذين يعانون من مرض كبدي شديد حيث أنه قد يتسبب في فقدان الوعي.

احتياطات

يجب استعمال سولان بحذر للمرضى الذين يعانون من الصرع، أو الماء الأسود في العين (جلوكوما)، أو انسداد بوابي-إثنى عشري، أو احتباس البول، أو خلل وظائف الكلى (قد يستدعي الأمر تخفيض مقدار الجرعة).

يجب إيقاف تناول هذا المستحضر قبل عمل أي فحص جلدي للحساسية لأنه قد يؤدي إلى الحصول على نتائج إيجابية غير حقيقية.

إذا تم جمع عينة بول خلال ٢٤ ساعة من تناول شراب سولان، فإن أحد نواتج أيض جوايفنزين قد يؤثر على لون النتائج المخبرية لفحص البول لحمض - هيدروكسي إندول الأستيك والحمض فانيليل مانيديل.

التأثيرات الجانبية

يعتبر سولان جيد الاحتمال عادةً، أحياناً تم تسجيل بعض التأثيرات الجانبية الطفيفة مثل الشعور بالنعاس والذي قد يزول بعد استمرار العلاج لأيام قليلة. على أية حال، فإنه نادراً ما قد يحدث تحفيز، وهذا ينتج على الأخص عند تناول الدواء بجرعات عالية أو عند الأطفال أو المسنين.

في بعض الأحيان القليلة تم تسجيل بعض التأثيرات الجانبية بالمثل صداع، واضطرابات نفس-حركية، وتأثيرات مضادة للمسكارين مثل احتباس البول، وجفاف الفم، وعدم وضوح الرؤية، واضطرابات الجهاز الهضمي.

كما سجل أيضاً في بعض الأحيان القليلة حدوث تفاعلات فرط الحساسية كتقلص الشعب الهوائية، والوذمة الوعائية، والاستهداف، والطفح الجلدي، والحساسية للضوء.

نادراً جداً ما تم تسجيل حدوث طنين في الأذن، وتأثيرات خارج الهرمي، ودوار، وأرتباك، واكتئاب، واضطرابات النوم، ووجعة، واختلاجات، وخفقان، وعدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، واضطرابات الدم، وقصور في وظائف الكبد، والتهاب أدمة الجلد التقشري.

الجرعة الزائدة

تتضمن الأعراض والعلامات الناتجة عن تناول جرعة كبيرة جداً من الدواء الشعور بالنعاس، وتخفيف الجهاز العصبي المركزي، وهذيان، واختلاجات، وتأثيرات مضادة للكولين (مضادة للمسكارين)، وعدم انتظام ضربات القلب.

يجب التركيز في العلاج على معالجة الأعراض مع اتخاذ الإجراءات الداعمة وتوفير العناية الخاصة بوظائف القلب، والقناة التنفسية، والكلى، والكبد، وكذلك باتزان السوائل والإلكتروليتات.

يوصى بإجراء غسيل للمعدة أو تحفيز المریض على التقيؤ باستعمال شراب الأبيكاك وذلك في الساعات القليلة الأولى من تناول الجرعة الزائدة. قد يتم تناول الفحم المنشط وعلاجات مسهلة من أجل تقليل امتصاص الدواء.

التفاعلات الدوائية

إن تزامن استعمال سولان مع مضادات الهستامين السببية للنعاس، أو ديازيبام، أو كلورل هيدرات، أو ترايكولوفوس صوديوم، قد يزيد من التأثير السبب للنعاس.

إن زيادة احتمال حدوث التأثيرات الجانبية المضادة للمسكارين متوقع عند تزامن استعمال سولان مع مضادات المسكارين، بينما تزامن تناوله مع أميتريبتين، أو إمبرامين، أو نورثرتين، قد يؤدي إلى زيادة كلاً من التأثيرات المسببة للنعاس والمضادة للمسكارين.

العوة

سولان شراب: زجاجة سعة ١٠٠ مل.

* يحفظ في درجة حرارة ١٥ - ٢٥°م.

(إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما المخبران بالدواء وينتفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون إستشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
و اتحاد الصيادلة العرب

للإستفسار: الرجاء الإتصال بالرقم المجاني ٤٩٩٤ - ٨٠٠ (٩٧١)

إنتاج: **جلفار**

التخليق للصناعات الدوائية.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.

